

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

“Ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση τραχήλου της μήτρας στην κύηση: κλινική αντιμετώπιση και τρόπος τοκετού”

Περίληψη

Σκοπός: Να δοθεί μια ολιστική εικόνα των διαφόρων περιπτώσεων των ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου κατά τη διάρκεια της κύησης μαζί με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τη διαχείρισή τους, και τον ενδεδειγμένο τρόπο τοκετού.

Σχεδιασμός/μεθοδολογία/προσέγγιση: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Ευρήματα: Η μόλυνση από HPV θεωρείται ως το πιο συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρακολούθηση της λοίμωξης με τεστ Παπανικολάου αποτελεί τη βάση για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Κατά την εγκυμοσύνη η θεραπεία των αλλοιώσεων αναβάλλεται για μετά τον τοκετό. Η μόνη ένδειξη για θεραπεία της τραχηλικής νεοπλασίας είναι ο διηθητικός καρκίνος. Ενδεδειγμένος τρόπος τοκετού υφίσταται μόνο για την περίπτωση διηθητικής νόσου και είναι η καισαρική τομή.

Πρωτοτυπία/αξία: Η ανασκόπηση των πλέον πρόσφατων βιβλιογραφικών πληροφοριών.

Λέξεις κλειδιά: Ιός ανθρώπινων θηλωμάτων, ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τραχήλου, εγκυμοσύνη, διαχείριση.

Abstract

Purpose: To give an holistic picture of the various cases of cervical intraepithelial lesions during pregnancy, along with the modern scientific view of management of the disease and proper mode of delivery.

Design/methodology/approach: Literature review.

Findings: The HPV infection is considered the most common sexually transmitted infection worldwide. The infection monitoring through Pap test is the basis for the prevention of cervical cancer. During pregnancy the treatment of lesions is postponed until after delivery. The only indication for the treatment of cervical neoplasia is the invasive cancer. An appropriate mode of delivery exists only in the case of invasive disease and is the caesarean section.

Originality/value: The review of the latest bibliographic information.

Keywords: HPV, CIN, pregnancy, management.